



Zelena dela v sadovnjaku



V sledečem prispevku vas bomo seznanili in praktično prikazali poletna - zelena dela v sadovnjaku. Za dovolj visok in kakovosten pridelek, je potrebno na vrtovih opraviti ista opravila, kot se jih izvaja v velikih nasadih.

Celoten članek in video na:

<http://zelenisvet.com/zelena-dela-v-sadovnjaku>

Strokovnjak za področje sadjarstva **Roman Mavec**, vodja **Poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici** nam predstavi vsa potrebna poletna zelena dela v sadovnjaku ali vrtu. Zelena dela obsegajo oskrbo celega drevesa z ciljem, da dobi drevo dovolj hranil in vode za optimalen razvoj, kako drevo pravilno privezujemo ob oporo, upogibamo poganjke, oblikujemo krošnjo, okopavamo zemljo pod krošnjo, opravimo zeleno ali poletno rez, redčimo odvečne plodove in skrbimo za varstvo pred boleznimi in škodljivci.

Obdelava tal pod krošnjami dreves

Tla pod krošnjami dreves ohranjamo brez plevelov in trave. Pleveli porabijo predvsem v nasadu mladih dreves veliko vode in hranil. Če imamo kolobar pod drevesom nezapleveljen se tudi voluhar okoli drevja nerad zadržuje. Visoka trava in pleveli voluharju nudijo zatočišče in tam ga ujede ter mačke ne opazijo. V čistem kolobarju ali herbicidnem pasu, če gre za vrsto dreves v sadovnjaku, se voluhar zelo nerad skriva in ne naredi gnezda.

Prednost nezatravljenega kolobarja pod drevesi v vrtovih je tudi v tem, da debela dreves ščitimo pred poškodbami med košnjo. Z kosilnico ali koso velikokrat odrgnemo deblo, te rane pa so pot do okužb z glivami, ki povzročajo odmiranje dreves. Za okopavanje zemlje v vrtovih uporabimo motiko. Okopavamo v sončnih dneh, da se plevel hitreje posuši. V večjih nasadih pa delo opravljamo strojno.

Tudi ko ni plevela z plitvim okopavanjem zemljo zrahljamo. Z rednim okopavanjem zdrobimo skorjo, ki se zaradi sušenja zemlje tvori na površini. Na ta način onemogočimo pretirano izhlapevanje vode in tudi motimo voluharja.

Zelena rez mladega drevesa

Poganjke privezujemo v vodoraven položaj, jih usmerjamo in smiselno razporejamo okoli osnovnega debla. Odstranimo konkurenčne poganjke vrhu – pavoditeljico in samo en poganjek pustimo, da nadaljuje rast. Vrh mladega drevesa privežemo na primerno razdaljo od količka, da se bo naslednje leto obrasel z novimi poganjki.

Drevje moramo začeti vzgajati že prvo leto po sajenju z ciljem vzgojiti drevo z rodnim volumnom in pravilno gojitveno obliko.

Zelena rez sadnega drevja

Zelena ali poletna rez sadnega drevja ni glavna rez, ki jo opravimo v času pred brstenjem. Z rezjo sadnega drevja uravnavamo razmerje rast in rodnost in ohranjamo vitalnost drevja. V letih ko je manj padavin in manj pridelka nam drevje bujno odžene, zato je potrebno odvečne poganjke odstraniti.

Z zeleno rezjo osvetlimo notranjost krošnje, povečamo zračnost krošnje, manjši razvoj boleznin in škodljivcev, izboljšamo kakovost plodov ter omogočimo boljšo dozorevanje in olesenost poganjkov.

Zelena rez breskve

Pri breskvi ločimo dva načina zelene rezi glede na čas zorenja breskev. Zgodnejše breskve režemo po obiranju, poznejše sorte režemo v času zorenja.

Tudi tu velja, pravilo, da ne izrežemo vseh poganjkov naenkrat temveč se opravila lotimo postopoma.

Breskve rastejo zelo intenzivno. Poganjki senčijo krošnjo, zato odstranimo najdaljše navpično rastoče poganjke. Izrezujemo prenizko rastoče poganjke, suhe poganjke, na koncu vej odvajamo predolge poganjke in določene poganjke tudi prepogibamo.

Poganjke breskev v času zorenja prav tako razredčimo, da spustimo sončno svetlobo do plodov, zaradi česar bodo plodovi lepše obarvani in slajši zaradi večje vsebnosti sladkorjev.

Posledično bodo tudi breskve lepše rodile, manj bo tudi boleznin in škodljivcev.

Zelena rez aktinidije – kivija

Pri aktinidiji krajšamo letošnje poganjke, da jih ustavimo v rasti. Krajšamo cca 1,2 metra od izraščanja. Ne odstranimo jih v celoti, ker nam ti poganjki naslednje leto tvorijo rodni les.

Redčenje plodov

V tem času lahko razredčimo plodove, da dosežemo boljšo kakovost plodov. Odstranimo plodove poškodovane od morebitne toče, drobne plodove in zakrnele plodove. Kjer se plodovi stikajo je tam velikokrat začrviviljeno od zavijačev, kot je jabolčni ali kak drug sadni zavijač, odvisno od sadne vrste.

Kjer pustimo en sam plod je tudi do 30 % manjša možnost napada zavijačev. Plodovi so tudi boljšega okusa in lepše obarvani. S tem redčenjem ne vplivamo več na rodnost drevja naslednje leto. Ročno redčenje plodov, kot terminsko redno opravilo v sadovnjaku opravimo po junijskem naravnem redčenju. O redčenju plodov smo govorili in praktično prikazali v članku Redčenje plodov na sadnem drevju.

Celoten članek in video na: <http://zelenisvet.com/zelena-dela-v-sadovnjaku>

© Zeleni svet



➔ Delite nasvet tudi z vašimi prijatelji!