

levo

Poskrbite, da si na istem mestu ne sledijo vrtnine, ki so v sorodstvu.

desno spodaj

Čer bo letoš rasel česen, drugo leto ne sadimo stročnic.

Kolobarjenje po užitnih delih

Leto	Prva vrtnina	Druga vrtnina
1. leto	visok fižol (seme)	špinača (list)
2. leto	kumare (plod) + bazilika (dober sosed)	ječmen ali pšenica (zeleno gnojenje)
3. leto	paradižnik (plod) + solata (dober sosed)	motovilec (list)
4. leto	motovilec (list)	visok fižol (seme)

Vir: www.zelenisvet.com

sledite temu zaporedju - pomembno je le, da si na isti gredi ne sledijo vrtnine z istim užitnimi delom -, potem ni težav s kolobarjem, saj tako rastline, ki si sledijo na gredi, niso v sorodstvu.

Kolobarjenje po družinah

Nekoliko bolj zahtevno je kolobarjenje, pri katerem je treba poznati sorodstvena razmerja med vrtninami. Najbolj je kolobariti po botaničnih družinah. Poskrbite, da si na istem mestu ne sledijo vrtnine, ki so v sorodstvu. Če kolobarite po principu botaničnih družin ali sorodstvu, je treba paziti, da si vrtnine iz iste botanične družine na istem mestu ne sledijo vsaj nekaj let.

Vrtnine naj si v kolobarju po botaničnih družinah sledijo približno v tem zaporedju:

1. Metuljnice ali stročnice (grah, bob, fižol, soja, leča)
2. Košarice (solata, endivija, radič)
3. Razhudnikovke (paradižnik, paprika, jajčevce, krompir)
4. Križnice (zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, kitajsko zelje, listnati ohrovt, koleraba, kolerabica, repa, redkev, redkvica, hren)
5. Liljevke (čebula, česen, por, šalotka,

drobnjak, špargelj)

6. Bučnice (kumare, bučke, buče, lubenice, melone)
7. Kobulnice (korenček, zelena, peteršilj, sladki komarček)
8. Lobodovke (rdeča pesa, špinača, blitva)
9. Aizojaceje (novozelandska špinača)
10. Slakovke (rabarbara)
11. Špajkovke (motovilec)
12. Trave (sladka koruza)

Mešani posevke

Če želite pridelati veliko zdrave zelenjave, poizkusite tudi z mešanimi posevki. V tem primeru na eni gredici rastejo različne vrste vrtnin, začimb in cvetja, ki so v dobrih odnosih. Če jih ustrezno kombinirate, bo v vrtu manj boleznih in škodljivcev. Zaradi skupne vzgoje rastlin s plitvimi in globokimi koreninami bodo tla bolj rahla, prazen prostor bolj izkoriščen, manj bo tudi plevelov.

Kolobar in gnojenje

Stročnic in kobulnic ne gnojite z gnojem. Ti skupini vrtnin prenašata le minimalno gnojenje s kompostom. Tudi organska gnojila, ki jih kupite v

Zlati pravili kolobarja

Za čebulo, česnom in ostalimi liljevkami nikoli ne sejemo graha, boba, fižola in drugih stročnic. To pa zato, ker čebula, česen in druge liljevke vsebujejo snovi, ki uničujejo bakterije (zato jih uživamo ob prehladu in drugih tegobah), za stročnice pa je značilno, da se na njihovih koreninah naselijo koristne bakterije, ki bogatijo zemljo z dušikom. Skratka, če bi za liljevkami sadili stročnice, bi to bilo pogubno dejanje. Vse druge kombinacije so dovoljene.

Za stročnicami sadimo požrešne vrtnine (križnice, razhudnikovke, bučnice).



trgovini, na teh gredicah uporabljajte v zelo majhnih količinah.

Za močno gnojenje z organskimi gnojili vam bodo hvaležne kobulnice (zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, kitajsko zelje, listnati ohrovt) in bučnice (kumare, bučke, buče, lubenice, melone).

Nad dokaj bogatim gnojenjem so navdušeni tudi razhudniki (paradižnik, paprika, jajčevce, zgodnji krompir).

Pri lobodnicah (rdeča pesa, špinača, blitva) in košaricah (solata, endivija, radič) količino komposta, gnoja ali kupljenega organskega gnojila v primerjavi s količino gnojenja za kobulnice in bučnice prepolovite.