



Zalivanje v vrtu



Poraba vode z zalivanjem je odvisna od posamezne vrtnine, razvojne faze rastline in vremenskih razmer. Na zmanjšano porabo vode pri paradižniku, papriki, kumarah, solati, zelju in drugih vrtninah vpliva tudi zastirka, ki je poleti dobrodošla v vsakem vrtu.

Celoten članek:

<http://zelenisvet.com/zalivanje-v-vrtu>

V kratkem in izčrpnem prispevku vam bomo svetovali kako pravilno zalivati paradižnik, papriko, jajčevac, kumare, buče, solato, radič endivijo, čebulo, česen, korenček, peteršilj, zeleno, rdečo peso, pastinak, zelje, cvetačo, brokoli, ohrovt in druge kapusnice. V članku bomo zaradi lažjega razumevanja uporabili besedo zalivanje, mislili pa bomo na namakanje, saj rastlinam samo z namakanjem tla ustrezno in zadostno namočimo.

Kako pogosto in kdaj zalivamo oz. namakamo?

Rastline namakamo zjutraj, ko so še ohlajene. Zapomniti si moramo predvsem dejstvo, da namakamo vsak tretji ali četrti dan in takrat tako obilno, da tla namočimo v globino. Zjutraj namakamo tako dolgo, da so tla namočena v globino vsaj 25 cm. Če vrtnine dnevno zalivamo z manjšimi količinami vode, se korenine usmerijo proti površini tal, vrtnine pa ob izpadu zalivanja zelo hitro trpijo za posledicami suše.

Zalivanje paradižnika, paprike, jajčevca, kumar in buč

Paradižnik, papriko, jajčevac, kumare in buče v času po presajanju ne zalivamo preveč. Potrebe vode se večajo ob močnejši začetni rasti, največje pa so v času od začetka razvoja plodov do spravila pridelka. Največjo oskrbo z vodo med vsemi vrtninami zahtevata paprika in kumare.

Paradižniku, papriki, kumaram in jajčevcu je najbolje omogočiti kapljično namakanje, tako jim zagotovimo dovolj vlage v tleh in manj vlage v zraku. V tla k vsaki plodovki lahko približno do polovice zakopljemo po eno 1,5-l plastenko, ki ji odrežemo dno in jo napolnimo z vodo. Plodovk nikoli ne zalivamo po listih. Tako bodo rastline manj dovzetne za bolezni.

Težave zaradi pomanjkanja vode na paradižniku, papriki, kumarah in bučkah

Plod paradižnika zaradi neenakomerne oskrbe z vodo poka. Pri paradižniku in papriki opazimo tudi odmiranje plodov (temna lisa) na dnu ploda. To se zgodi zaradi pomanjkljive oskrbe z vodo in posledično nezadostni oskrbi s kalcijem. Zaradi tega vzroka se sušijo in propadajo tudi plodiči kumar in bučk. Pri kumarah se plodovi zaradi

pomanjkanja vode zvijajo, plodovi so tudi grenkega okusa.

Zalivanje solate, radiča in endivije

Solatam ugaja vlaga v zraku in tleh, zato jih lahko z vrtno zalivalko zalivamo tudi po listih. Če je spomladi dovolj padavin zalivamo samo ob presajanju. Tudi za solato velja, da jo sadimo v vlažna tla in zalivamo po sajenju. Solata, endivija in radič imajo največje potrebe po vodi teden ali dva pred spravilom, če je takrat suša vsekakor zalivamo. Kljub temu, da je poletni rastna doba solate krajša, je poraba vode večja za slabo tretjino.

Kako zalivamo čebulo in česen?

V času, ko se čebula debeli, to je v drugi polovici maja in juniju je treba namakati. To je vsekakor koristno v primeru suše. Z zalivanjem čebule in česna prekinemo v času začetka poleganja prvih listov. Pri spravilu mlade čebule, pora in česna zalivamo vse do spravila pridelka.

Zalivanje zelja, cvetače, brokolija, ohrovtu in drugih kapusnic

Zelje, cvetačo, brokoli, ohrovt in druge kapusnice je treba za dober razvoj in ukoreninjanje sadik saditi v vlažna, dobro namočena tla. Najbolje je, da jih sadimo v vlažna tla ali dobro zalijemo sadilno jamico že ob sajenju. Na namakanje ne smemo pozabiti tudi po sajenju, sadike po sajenju dobro zalijemo vsaj trikrat. Vse vrste kapusnic je najprimerneje zalivati s pršenjem, uporabimo lahko tudi vrtno zalivalko, s katero zalivamo tudi po listih.

Kdaj najbolj zalivamo kapusnice?

Glavnato zelje rabi največ vode v času oblikovanja glav. Največja poraba vode pri srednje zgodnjem zelju nastopi slaba dva meseca po presajanju, pri poznih sortah pa slabe tri mesece po presajanju. Podobne so tudi zahteve pri ohrovtu in drugih kapusnicah. Cvetača in brokoli imata največje potrebe po vodi v času tvorbe rože in izrazitega razvoja listne mase. V poletnem času so potrebe po vodi večje.

Zalivanje korenčka, peteršilja, zelene, rdeče pese in pastinaka

Po setvi korenčka, peteršilja, zelene, rdeče pese in pastinaka so potrebe po vodi majhne. Čas od setve do kalitve ni odvisen od vlažnosti tal, na to vpliva predvsem temperatura tal. Zgodnje spomladanske setve korenčka, peteršilja v ustrezno vlažna in občutno prehladna tla, so zato pogosto neuspešne. Po kalitvi in razvoju rastline se potrebe po vodi večajo. Med korenovkami velja korenček za največjega porabnika vode.

Celoten članek:

<http://zelenisvet.com/zalivanje-v-vrtu>

© Zeleni svet



➔ Delite nasvet tudi z vašimi prijatelji!