

## Leča, čičerika, fižol in ostale stročnice



Leča in čičerika sta po krivici nekoliko pozabljeni vrtnini v domačih vrtovih. Nizek fižol, grah in bob so vsekakor bolj pogoste stročnice, ki jih opazimo v Slovenskih vrtovih.

Spoznamo kdaj je najbolj primeren čas setve fižola, graha, boba, leče in čičerike. Miša Pušenjak svetuje, tudi o dobrososedskih odnosih med posameznimi vrtninami.

Celoten članek in video na:

<http://zelenisvet.com/leca-cicerika-fizol-strocnice>

### Čas setve leče, čičerike in nizkega fižola

Leča in čičerika sta stročnici za vroča poletja, ki rabita toplo zemljo. Čičeriko običajno sezemo v času setve kumaric. To opravilo je treba opraviti od 10-ega maja do sredine maja in ne v začetku maja, kot to pogosto storimo.

Leča ni tako temperaturno občutljiva kot čičerika in jo lahko sezemo tudi v času setve fižola. Čičeriko sezemo nekoliko kasneje, vsekakor po prvem maju. Obe stročnici lahko sezemo tudi nekoliko kasneje, ker sta zelo dobro odporni na sušo. **Če ju sezemo prehitro** nam nizke nočne temperature povzročijo, da leča in čičerika zstaneta v rasti, veliko manj tudi cvetita in rodita.

Nizek fižol so letos nekateri že sezali. Treba je vedeti, da je nas vreme z nizkimi temperaturami še vedno lahko presenetil vsaj še mesec dni, kar je za fižol, lečo in čičeriko vsekakor neugodno. Miša Pušenjak svetuje, da lahko nizek fižol v tem letu sezemo že v tem času, z lečo čičeriko in visokim fižolom je treba še počakati.

Ob zgodnji setvi fižola še vedno tvegamo z nizkimi temperaturami, ki se do konca aprila še vedno lahko pojavi. Nizek fižol je na Primorskem že posejan, v drugih delih Slovenije si pripravimo belo vrtno tkanino in ga v primeru nizkih temperatur pravočasno zaščitimo.

### Dobri sosedje leče, čičerike in ohranjanje rodovitnih tal

Leča in čičerika sta stročnici, zato ju je najbolje sezati ali saditi v bližino kapusnic. Najbolje ju je sezati ob ohrovte, ki jih sadimo v maju. Prostor lahko najdeta tudi ob bučnicah (kumare, lubenice, bučke, melone), ki jih je v tem primeru bolje gojiti ob opori, da se ne plazijo po tleh in zavirajo lečo in čičeriko pri razvoju. Sejemo in sadimo ju lahko tudi ob paradižnik.

Obe stročnici rahljata tla, tudi ostale stročnice v tleh puščajo ogromno humusa, zato so obvezni člen v vsakem vrtu. Koren in vseh stročnic nikoli ne odstranjujemo z vrta, saj so vir organske snovi, humusa in bogatijo tla z dušikom.

# Čas setve fižola in ostalih stročnic v spomladanskem času

Večina vrtičkarjev bo zagotovo še sejala **visok fižol**, če s setvijo prehitevate pridelek ne bo nič bolj zgoden, ker cveti, ko se dan dovolj skrajša. **Okrog 1. maja v rastlinjake posejemo tudi dolgo vigno**, ki je sorodnica visokega fižola in zraste v višino paradižnika.

Še vedno lahko sejete **nizki fižol**, ki v poletni vročini daje celo boljši pridelek od visokega fižola, za setev leče in čičerike je treba počakati vsaj še mesec dni. V sredini aprila je čas, ko lahko sejete lečo in čičeriko za sadike, zato tega opravila ne zamudite.

V tem času smo nekoliko prepozni za **setev boba**, ker ima v dolgem dnevu več težav z boleznimi in škodljivci, tudi cvetel bo slabše. **Grah** še vedno lahko sezemo, vendar ob dolgem dnevu preneha cveteti in pridelek bo nekoliko manjši.

<http://zelenisvet.com/leca-cicerika-fizol-strocnice>

© Zeleni svet

