

Redčenje plodov na sadnem drevju



V tem zelo pomembnem prispevku vas bomo seznanili in praktično prikazali redčenje plodov, kot vsakoletno nujno opravilo v sadovnjaku. Plodove redčimo pri jablanah in hruškah, ter breskvah. Z ukrepom ohranjamo ustrezno kvaliteto plodov in kar je najpomembnejše – vsakoletno rodnost.

Celoten članek in video na:

<http://zelenisvet.com/redcenje-plodov-sadnem-drevju>

Matjaž Maležič, vodja Sadne drevesnice Studenec svetuje zakaj in kako redčimo plodove in kdaj je optimalen čas redčenja plodov. Za ohranjanje redne rodnosti pri jablanah in primerne kakovosti plodov, je redčenje plodov vsakoletno nujno opravilo.

Kdaj plodove redčimo?

Na začetku prispevka naj opozorimo, da je letošnja pomlad 2014 vegetacija nekoliko prehitela in je bilo to opravilo potrebno opraviti v zadnji dekadi maja. Načeloma pa se ročno redčenje plodov opravi na začetku junija, po naravnem redčenju plodičev. Zato je prispevek napisan in posnet v optimalnem času omenjenega opravila.

Vsako leto posebej pa bomo ljubiteljske vrtičkarje in sadjarje pravočasno opomnili, kdaj je primeren čas za redčenje plodov.

Zakaj plodove redčimo?

Eden izmed najpomembnejših ciljev redčenja je ohranjanje redne - vsakoletne rodnosti. V letih, ko je na drevesu obilen cvetni nastavek in tudi dobra oprahitev ter oplodnja, drevo nastavi preveč plodov. Za ohranjanje primerne ravnovesja med letošnjo rodnostjo in nastavkom cvetnih brstov za naslednje leto je potrebno plodove redčiti.

Preveč plodov odvzame drevesu preveč hranil, da nastavi in razvije tekom poletja cvetne brste za naslednjo pomlad.

V plodove naj bi se razvilo na drevesu 10 - 15 % cvetov.

Z redčenjem in primerno razporeditvijo plodov pridelamo debelejšje in lepše plodove, pri poznih sortah jablan se takšni plodovi tudi bolje skladiščijo in bodo dlje časa obdržali svoje lastnosti. Enakomerno razporejeni plodovi se

ne bodo medsebojno izrivali in posledično odpadali.

Omejujemo pojav bolezni in škodljivcev. Jabolčni zavijač (gosenica metulja, ki povzroča črvivost plodov) se ponavadi seli iz ploda v plod, kjer se plodovi stikajo. Širjenje okužbe z navadno sadno gnilobo je prav tako izrazit pojav pri preveliki gneči v deževni sezoni.

Kako redčimo plodove?

Plodove v manjših sadovnjakih in vrtovih redčimo ročno. Pazimo, da ne odtrgamo tudi brstov. Tam kjer je bil cvetni šop in kasneje plodiči pustimo samo en plodič, da se razvije v zavidanja vreden plod. Uporabimo lahko tudi škarje, da opravilo lažje in hitreje izvedemo in posledično ne napravimo škode z zatrgavanjem.

Katere plodove odstranimo z redčenjem?

Odstranimo zaradi pozebe poškodovane plodove, z boleznimi okužene in od škodljivcev napadene plodove, nesimetrične plodove, plodove na vejah v notranjosti krošnje, ki so slabo osvetljeni in plodove na povešenih vejah, ki se dotikajo tal. Takšne veje v tem času tudi prikrajšamo ali odrežemo. Prav tako odstranimo kakšno bohotivko (pokončno vejo, ali domače divjak), ki senči plodove.

Omenjeni plodovi se bodo slabše razvili, zato jih raje odstranimo, da ne jemljejo potrebnih hranil ostalim plodovom, ki se bodo normalno razvili in dozoreli.

Celoten članek in video na:

<http://zelenisvet.com/redcenje-plodov-sadnem-drevju>

© Zeleni svet

