

Kako sejemo za sadike paradižnika, paprike, čilijev in ostalih plodovk?



Se sprašujete kdaj in kako sejati za sadike paradižnika, čilijev, paprike, feferonov in jajčevcev? Rešitev je preprosta, če upoštevate priporočen čas za setve domačih sadik. Po setvi je treba poskrbeti za redno zalivanje, dognjevanje in presajanje. Če rastlinam zagotovite dovolj svetlobe in primerno temperaturo, je uspeh zagotovljen.

Kliknite na video za ogled nasveta:



Kdaj sejemo paradižnik?

Paradižnik za sadike sejemo **od konca februarja do začetka marca**, če ga sadimo v vrt v celinski Sloveniji. V obalnih področjih in toplejšem zahodnem delu Slovenije s setvami prehitevamo za 14 dni

ali tri tedne.

Sadika potrebuje za razvoj 60 do 70 dni. Več o optimalnem času setve, pikiranja, presajanja sadik v rastlinjak in vrt si lahko preberete v nadaljevanju (tabela).



Sadike paradižnika na okenski polici.

Pladenj s čepki je enostavna rešitev za setev sadik

Semena paradižnika položimo na pladenj s **čepki iz kamene mineralne volne**, ki nimajo dodanih hranil in dobro vežejo vodo. Vodi za zalivanje že ob prvem zalivanju **dodajamo pripravke na osnovi alg**, da rastline oskrbimo s hranili. Če tega ne naredimo so rastline v začetku rasti lačne. Pladenj s čepkom je priročen tudi za setev paprike, jajčevca, čilija in ostalih vrtnin.





Setev paradižnika v čepke.

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup čepkov za setev paradižnika, paprike in ostalih plodovk. Za dodaten nasvet in pomoč lahko tudi pokličete na 04 511 41 01.

Zakaj sejemo v čepke iz kamene mineralne volne?

Če sezemo v čepke je sadike ob razvoju prvega pravega lista lažje presajati, kot v primeru setve v stiropor z luknjami. **Z uporabo čepkov presajanje (pikiranje) v večje lončke postane enostavno opravilo.**

Če primerjamo čepke s šotnimi tabletkami, se po pikiranju iz čepkov korenine brez težav razraščajo v lonček. Manj je tudi nevarnosti za poškodbo nadzemnih delov rastline, ki se lahko pojavijo ob premikanju rastlin iz multiplošč in setvenic v večje lončke.

Po setvi čepke pršimo z vodo in hranili

Čepke postavimo na pladenj in pršimo z vodo, ki smo ji dodali hranila (alge, hitro dostopna hranila). Čepke v katero smo sejali seme **pršimo zmerno**, da se bolje razvije koreninski sistem. Predlagamo, da jih pršite z vseh strani tako, da ob stisku spodnjega dela čepka od njega ne kaplja.

Omočenost čepka preverite tako, da čepek brez semena prerežete in preverite, če je navlažen tudi v notranjosti. Tako ustvarimo dobre pogoje za kalitev semena, saj **ne želimo, da je čepek preveč zasičen z vodo**. Na enak način opravimo setev za sadike paprike, čilijev, jajčevcev in feferonov.

Pršimo lahko tudi vsak dan, ko so čepki nad radiatorjem, kasneje po potrebi. Omenili smo, da je treba pršiti tako dolgo, da od čepka pri stisku ne kaplja. Tako paradižnik kali že v slabem tednu dni. To vlažnost je treba ohranjati do pikiranja v večje lončke. Čepkov nikoli ne zalivamo z zalivalko!



Čepke pršimo z vodo.

Pravi čas za pikiranje je pomemben



Ob pojavu prvega pravega lista paradižnik s čepkom enostavno presadimo (pikiramo) v lonček premera 9 ali 12 cm, ki ga napolnimo z zemljo.

To obdobje običajno nastopi, **ko se klični listi postavijo v vodoravni položaj.**



Prepirirane paprike.

Kdaj pikirajo v profesionalnih vrtnarijah?

Pikiranje v boljših vrtnarijah v Sloveniji opravljajo roboti, ki majhno sadiko ob razvoju prvega prvega lista primejo ob robu koreninske grude in jo presadijo v lonček. Tako vzpodbudijo razraščanje koreninskega sistema.

Sadiko posadijo do kličnih listov. Takšen način presajanja (pikiranja) smo spremljali v večji družinski vrtnarji v Prlekiji. **Predlagamo, da v tej fazi pikirate tudi domače sadike.** Sadike, ki so vzgojene v lončkih imajo večji koreninski sistem in bolje prenesejo stres ob presajanju v vrt ali rastlinjak.



Pikiranje sadik s pomočjo robota v družinski vrtnariji Cornus.

Tabela 1: Pomembni podatki za sadike paradižnika (celinska Slovenija, Primorska)

Setev za sadike	Pikiranje	Presajenje sadik v neogrevan rastlinjak	Presajanje na prosto (vrt)
Konec februarja-začetek marca (celinska Slovenija)	Pikiranje (presajanje) opravimo, ob razvoju prvega pravega lista	Sredina aprila do konca aprila (celinska Slovenija)	Sredina maja (celinska Slovenija)
sredina februarja (Primorska)	Pikiranje (presajanje) opravimo, ob razvoju prvega pravega lista	Konec marca, začetek aprila (Primorska)	Sredina aprila do začetka maja (Primorska)



Prenesi tabelo (PDF)

Zalivanje sadike v lončku

Sadike lahko zalivamo tako, da lončke postavimo v pladenj in jih zlijemo z zalivalko. Po zalianju počakamo minuto in odvečno vodo odlijemo, da lončki ne stojijo v vodi.

Če so lončki suhi, jih lahko v vodi zadržimo nekoliko več časa. Vezava vode je odvisna tudi od zemlje. Priporočamo, da odvečno vodo porabite ob ponovnem namakanju ali zalianju.

Setev za sadike paprik, čilija in feferonov

Papriko sejemo vsaj teden dni pred paradižnikom. Upoštevajte podatke iz zgornje tabele o paradižniku. Setev za sadike feferonov in čilija se časovno in opravilno ujemajo s papriko. Do kalitve naj bodo čepki s semenom nad toplim radiatorjem.

Pod lončkom postavimo brisačo, da se preveč ne pregrejejo. Toploto je treba zagotoviti tudi v nočnem času. V hladnih hišah bodo rastline kasneje kalile. Po kalitvi jih postavimo na okensko polico, ob razvoju prvih listov pa v hladnejši svetel vetrolov.





 Zeleni svet

Čepke na pladnju postavimo nad radiator.

Kdaj sejemo za sadike jajčevcev?



Plod jajčevca v košari.

Setev za sadike jajčevcev se ujema s s setvijo za sadike paradižnika. V celinskem delu Slovenije ga običajno sejemo v začetku marca. Tudi v tem primeru je treba za hitro in uspešno kalitev **postaviti sadike na radiator, ki jih spodaj zaščitimo z brisačo.**

Po kalitvi jih prestavimo na okensko polico, ki je podložena s stiroporom ali brisačo. Tako se sadike ne bodo preveč ohladile.

Zalivanje in dognojevanje v lončku

Tudi v lončku pazimo, da sadik ne namočimo prekomerno. Vodi za zalivanje enkrat na teden **dodamo pripravke na osnovi alg**, ki pospešujejo ukoreninjanje sadike in rast nadzemnega dela. Še bolje so dosegljiva **hitro dostopna gnojila**, ki jih raztopimo v vodi.

Nekaj hrani je tudi v zemlji, ki ste jo uporabili ob pikiranju sadik. Z gnojenjem v času razvoja sadik ne pretiravajte, da se sadike ne pretegnejo. Rastlini v času rasti **zagotovite dovolj svetlobe in primerno temperaturo**, ki se giblje okrog 15 °C.



Vodi za zalivanje ali pršenje dodamo hranila.

Primerna temperatura za sadike

Paradižniku, papriki in ostalim plodovkam je treba zagotoviti visoke temperature v začetku rasti. V času vznika, je treba vsem sadikom zagotoviti 25 °C, drugače se čas kalitve podaljša.

Če je temperatura ob razvoju drugega in tretjega lista previsoka se sadike hitro „pretegnejo“. Rast sadik uravnavamo tudi s temperaturo in ne samo s svetlobo.





Sadika paprike.

Tabela 2: Optimalna temperatura za vzgojo sadik paradižnika, paprike, feferonov, čilijev, jajčevcev

Zelenjadnica	Optimalna temperatura (°C)			
Vrsta zelenjave / optimalna temperatura	vznič	do 1. lista	2 do 3 listi	večja sadika
Paradižnik	24-26	16-18	14-15	10-14
Paprika, čili, jajčivec, feferoni	25-27	18-20	16-18	14-16



Prenesi tabelo (PDF)

Hidroponska vzgoja sadik za napredne uporabnike

Seme paradižnika in ostalih plodov **sejemo v čepek in pršimo**. Ob pojavu prvega prvega lista rastlino s čepkom postavimo v kocko. Ostalih sadik (solata, zelje, ...) ni potrebno presajati in jih s čepkom takoj po setvi postavimo v kocko.

V maju kocko prestavimo na večji blok, da se korenine razraščajo v nižje plasti rastnega medija. Tako boste na balkonu ali terasi pobirali pridelek v sredini poletja.



**1****Seme****2****Umetitev
čepka v kocko****3****Prestavitev kocke
na večji blok***Hidroponski način vzgoje.*

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup celotnega seta za urbano vrtnarjenje. Za dodaten nasvet in pomoč lahko tudi pokličete na 04 511 41 01.

Rastline, ki jih gojimo na hidroponski način zalivamo zmerno in redno dodajamo hranila, ki jih **uporabljamo v hidroponiki**. Paradižnik, paprika, jajčevec in ostale plodovke potrebujejo največ vode v obdobju tvorbe plodov. Takrat se hidroponski način vzgoje zagotovo obrestuje, saj rastlina ne trpi pomanjkanje vode.

Sadikam zagotovite dovolj svetlobe

Sadikam, ki jih gojite v stanovanjih je treba zagotoviti dovolj svetlobe. Tako ne bodo preveč velike. Če se „pretegnejo“ je treba nekoliko zmanjšati temperaturo in povečati svetlogo. V začetku naj bodo na toplem, kasneje pa v hladnejšem svetlem vetrolovu ali rastlinjaku.

Pred presajanjem v vrt poskrbimo, da so čez dan vsaj teden dni na prostem. Tako se navadijo zunanjih rastnih razmer.

Zeleni svet priporoča:

Enostavno vrtnarjenje vam omogočajo čepki (vložki) za setev sadik in ostali izdelki za urbano vrtnarjenje. Odkrijte si daleč boljši svet!





za urbano vrtnarjenje. Olajšajte si delo s sadikami in sejte v čepke, ki jih kasneje presadite v zemljo ali kocke, bloke in gojitveno ploščo iz kamene volne.

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup čepkov za setev paradižnika, paprike in ostalih plodovk.

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup celotnega seta za urbano vrtnarjenje.

Za dodaten nasvet in pomoč lahko tudi pokličete na 04 511 41 01.