

Spoznajte novo jagodičje



Novo jagodičje je vse bolj priljubljeno v samooskrbnih vrtovih. V zadnjih letih je opaziti veliko novosti, zato smo se odločili, da jih nekaj bolj podrobno predstavimo. Zagotovo ste že slišali za fourberry, sibirsko borovnico, tayberry in malino brez trnov. Novosti so vedno privlačne, zato je dobro poznati osnovne zahteve, ki jih ima posamezna rastlina.

Fourberry je na trgu že nekaj let

Fourberry je v preteklosti krasil predvsem okrasne vrtove. To je predvsem zasluga prijetno dihtičnih rumenih cvetov in listja, ki se jeseni obarva v rdečkasto barvo. V zadnjem času so z žlahtnenjem pridobili sorte, ki imajo plodove primerne za svežo porabo in predelavo.



Sorta fourberry-ja 'Black Gem'

Tabela 1: Sorte fourberry-ja in njihove značilnosti

Sorta	Čas zorenja	Značilnosti ploda
Black Pearl	od sredine julija do konca julija	velike jagode, sočno sadnega okusa
Black Gem	konec julija in dva tedna v avgustu	veliki pridelek in jagode, sočno sadnega okusa
Black Saphir	od začetka avgusta naprej	velike jagode, samo dobro dozorel plod razvije značilno sadno aroma

KLIKNITE TUKAJ in si preberite več o gojenju jagodičja v domačem vrtu.

Na zgornji povezavi kjer najdete tudi obširnejša navodila za gojenje malin, robid, ribeza, kosmulje, ameriških borovnic in ostalega jagodičevja. Pri vzgoji vam bodo zagotovo pomagali tudi celoviti nasveti gojenje drugih sadnih vrst.

Sajenje in rez fourberry-ja

Tako kot ribez tudi fourberry sadimo nekoliko globje v tla, da se bolje obrašča s poganjki. Ob sajenju v sadilno jamo dodamo kompost, nekaj šote, tla rahlo zakisamo še z žaganjem iglavcev.

Rez opravimo podobno kot rdeči ribez. To naredimo tako, da starejše veje od 5-ih let izrežemo do tal. Za vzdrževanje rodnosti v prihodnjih letih iz tal pustimo izraščati mlade močne poganjke. Če grm osipamo, dosežemo boljšo rast novih poganjkov.

Sibirsko borovnico obiramo že meseca maja

Plodovi sibirske borovnice so prvi v sezoni in v domačem vrtu se jih veselimo že meseca maja. Nikoli je ne sadimo v kislo zemljo, ki ustreza samo ameriškim borovnicam. Te pa nimajo nič skupnega s sibirsko borovnico, ki najbolje uspeva v navadni vrtni zemlji.



Zeleni svet

Sibirska borovnica sorta 'Fialka'

Za boljše vraščanje sadike v sadilno jamo dodamo nekaj šotnega substrata in zrelega komposta. Rastlina bo bolje uspevala v odcednih in vlažnih tleh. Zbita ilovnata tla in stoječa voda nista primerno okolje za sibirsko borovnico. Ker rabi malo prostora jo lahko sadimo tudi v loncih. V vrtu jo sadimo na razdaljo 1 m.

Tayberry je križanec med robido in malino



Križanec med robido in malino imenujemo **tayberry**. To vse bolj priljubljeno jagodičevje zori julija in avgusta. Če v domač vrt posadimo 4 m tayberry-ja lahko pričakujemo do 12 kg okusnih plodov.

Če želimo rastlino brez trnov, ki nam omogoča lažje delo v vrtu izberemo sorto »Buckingham«.

Malina brez trnov

Poganjki maline Little red princess so brez trnov, močni in dosežejo v višino 80 do 100 cm. Plodovi zorijo od sredine avgusta do oktobra. So srednje veliki, stožčasti, živo rdeči in odličnega okusa. V februarju jo porežemo na 5 – 10 cm visoko. Če jo skrašamo manj, zarodi na dvoletnih poganjkih že v juniju.