

Asimina ali indijanska banana



Asimina je poznana kot drevesna sadna vrsta z izjemno zdravilnimi plodovi. Njena izvorna domovina so gozdovi vzhodnega dela ZDA. Drevo so poznali in gojili že staroselci – indijanci, zato tudi ime indijanska banana.

Zadnja desetletja pa asimina predmet številnih raziskav in ljubitelji vsega dobrega in zdravilnega jo gojijo na vrtovih širom sveta. Ko okusimo asimino nam v ustih **okus potegne na mango, banano in ananas**. Plodovi vsebujejo **ogljkove hidrate, veliko vitaminov in mineralov**.



Okus asimine spominja na mango, banano in ananas.



Iz asimine lahko pripravimo tudi okusno marmelado.

Rez asimine



Na sliki 5 let staro drevo asimine.

Asimina tvori habitus oz. drevesasto obliko rasti velikosti od 4 do 5 metrov ali srednje velik grm do 4 metre, v kolikor jo z rezjo gojimo v grmastih oblikih.

Habitus (drevo ali grmasta rast) je predvsem odvisna od tega za katero sorto se odločimo.

Drevesaste oblike imajo že po naravi bolj **piramidalno** – konično obliko rasti, zato jo lahko pustimo rasti v naravno krošnjo.

Če jo gojimo kot prostorastoče drevo je treba zelo malo rezi. Odstranimo poškodovan, pregost in odmrli les. Nekaj zmerne pravilne rezi pa lahko pospeši več nove rasti in s tem večji pridelek in bolje oblikovano krošnjo, ki se ne poveša. **Več o rezi asimine si preberite članek TUKAJ.**

KLIKNI TUKAJ za samooplodno sorto asimine Sunflower. Sadike velikosti 90+ cm.

KLIKNI TUKAJ za samooplodno sorto asimine Prima. Sadike velikosti 100+ cm.

Za več informacij ali naročilo nas lahko tudi pokličete na 031 848 038.

Kako razmnožujemo asimino in kakšne sadike so primerne?

Vedno se odločimo za nakup cepljene sadike in izbora sorte, ki so samooplodne (sorte **Sunflower** in **Prima**). Cepljenja in vzgoje sadik se ne lotimo sami, saj bomo na plodove dolgo čakali. Navadno se cepi na dve do triletne sejance na način spomladanske kopulacije.



Priporočen je nakup samooplodnih sort, kot sta Sunflower in Prima.

V kolikor smo imeli nesrečo in kupili asimino, ki ni samooplodna lahko na obstoječe drevo cepimo ostale sorte asimine in tako zagotovimo pridelek. Cepimo na način spomladanske angleške kopulacije. **Ne izvajamo ploščične in T-okulacije**, saj številni sadjarji poročajo, da je ta način neuspešen.

Zelo pomembno pri cepljenju je tudi pravi termin nabiranja zimskih cepičev in tudi termin samega cepljenja. Za domačo vzgojo sadik ne pridejo v poštev potaknjenci, prav tako ne koreninski izrastki.

Asimino presajamo vedno s koreninsko grudo, kar pomeni, da **kupujemo izključno kontejnersko vzgajane sadike**. Rastline z golimi ali pretirano poškodovanimi – vidno zgnitimi koreninami ne presajamo, saj se težko primejo.

Opraševanje asimine

Asimina v osnovi ni samooplodna, zato se nikoli ne odločamo saditi sadik brez ustrezne dekleracije. Nekatere rastline so po oprševanju celo med seboj nekompatibilne.

Izbiramo sorte, za katere je potrjeno, da so samooplodne (sorte Sunflower in Prima). Prav tako poznamo sorte, ki niso samooplodne. **Asimino opršujejo mravlje in muhe**, ker čebelam in čmrljem vonj cvetov ne ugaja.





Cvet asimine

KLIKNITE TUKAJ za samooplodno sorto asimine Sunflower. Sadike velikosti 90+ cm.

KLIKNITE TUKAJ za samooplodno sorto asimine Prima. Sadike velikosti 100+ cm.

Za več informacij ali naročilo nas lahko tudi pokličete na 031 848 038.

Cvetovi so rdeče do temno rdeče do rjave barve privešajoči se na kratkem peclju. **Cveti tik pred olistanjem v mesecu aprilu.**

Klimatske in talne zahteve za gojenje asimine

Asimina je odporna na oster mraz in tudi bolj sušne razmere. **Ni primerna za pretopla območja**, saj je za nastavek cvetnih popkov nujna potrebna vsota vsaj 400 ur nizkih zimskih temperatur.

Zemlja v katero sadimo asimino naj bo globoka, rahlo kisla, hranično bogata in zmerno vlažna. Pomembno pa je, da so **tla prepustna za vodo**, saj ne trpi stoječe vode. Ne ustreza ji presežek kalcija v tleh. Rastišče zato skrbno pripravimo in dodajmo več komposta, gozdne rahlo kisle zrele listovke izpod kostanjev in poskrbimo za drenažo.

Asimina ima rada tudi nekoliko več kalija, zato ga dodajmo kasneje v času vegetacije tudi foliarно, to je preko listov. Pri sajenju uporabimo kvalitetna sadjarska gnojila, ki vsebujejo tudi mikrohranila v sledovih.

Če so tla vidno neugodna (zbitost tal, visok izmerjen pH, plitva zemlja in težka ilovica) ne pripravimo skrbno le sadilne jame, temveč obdelajmo večjo površino in prav tako vsaj toliko v globino kolikor lahko.

Asimina je pri nas zdrava sadna vrsta in ne potrebuje varstva pred boleznimi in škodljivci.

Iz listov asimine pripravimo naravno škropivo

Listi asimine vsebujejo asimicin. **Asimicin** je snov, ki deluje insekticidno. Tik pred odpadanjem listov jeseni liste poberemo in v senci posušimo. Nabiramo jih v suhem in sončnem vremenu sicer nam zgnijejo.

Škropilno brozgo pripravimo iz nekaj listov in shranimo v steklenici do pomladi v temnem prostoru.

Obiranje plodov



Plod asimine.

Plodovi asimine dozorijo postopoma do konca septembra in začetku oktobra. Obiramo tik preden začnejo odpadati. Asimina navadno rodi tretje ali četrto leto.

Zeleni svet priporoča:

Asimina je nezahtevna sadna vrsta, ki v vrtu nima težav z boleznimi in škodljivci. V ponudbi so kakovostne sadike samooplodnih sort.

KLIKNITE TUKAJ za samooplodno sorto asimine Sunflower. Sadike velikosti 90+ cm.
KLIKNITE TUKAJ za samooplodno sorto asimine Prima. Sadike velikosti 100+ cm.