

Naravne rešitve proti bramorju v vrtu



Bramorja v vrtu se lahko znebimo na več načinov. Zelo učinkovito je varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki jih zmešamo z vodo za zalivanje. Lovimo ga tudi v kozarce napolnjene z vodo, hlevski gnoj, gnezda polivamo z vodo, motimo ga z okopavanjem in zelišči. Med pticami ga lovijo predvsem škorci. Teknejo tudi ježu, krtu in ostalim naravnim sovražnikom.

Kliknite na video za ogled nasveta:



Biotično zatiranje škodljivcev
Entomopatogene ogorčice so neškodljive za gojene rastline in niso nevarne ljudem in živalim.

Oglejte si poznejše skupna raba

Biotično zatiranje z entomopatogenimi ogorčicami

V Sloveniji je zelo razširjeno in učinkovito biotično varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki na povsem naraven način odstranijo bramorja z vrta. **Entomopatogene ogorčice konec aprila in v maju zmešamo z vodo za zalivanje in zaličimo vrtne gredice.** Tako na novem ekološki način

maju zmesamo z vodo za zalivanje in zalijemo vrte in grede. Tako na povsem ekološki način ukrepamo proti bramorju v domačem vrtu. Zalivanje ponovimo tudi v septembru.



zeleni svet

Zalivanje z entomopatogenimi ogorčicami.

Treba je vedeti, da je za uspešen in učinovit boj proti bramorju **ponovimo tretiranje z entomopatogenimi ogorčicami tudi v pozno poletnem času**. Najbolje v septembru, ko se poletna vročina umiri.

KLIKNITE TUKAJ za naročilo pripravka Nemastar 5 mio (10 m²)

KLIKNITE TUKAJ za naročilo pripravka Nemastar 25 mio (50 m²)

KLIKNITE TUKAJ za naročilo pripravka Nemastar 50 mio (100 m²)

KLIKNITE TUKAJ za naročilo pripravka Nemastar 250 mio (500 m²)

Z uporabo entomopatogenih ogorčic na naravi prijazen način preprečimo škodo bramorja v domačem vrtu.

Kolikokrat je treba ukrepati proti bramorju?

Z entomopatogenimi ogorčicami zalivamo vrt **dvakrat na leto**. To ponavljamo vsaj tri leta, toliko traja tudi življenjska doba bramorja. Tako prekinemo razmnoževalni ciklus bramorja.

Vedno zalivamo cel vrt in ne samo gred na katerih rastejo ogrožene rastline. Priporoča se, da zalijemo tudi kakšen meter okrog vrta. **Najbolje je zalivati pred dežjem** ali v rahlo oblačnem vremenu, ko ni močnega sonca.



Foto: Slavica Molan

Bramor je resen škodljivec v vrtu.

Za boljše delovanje zalivanje ponovimo v 14 dnevih po prvem zalianju. Ves čas je treba ohranjati tudi vlažna tla, da se ogorčice ne izsušijo.

Način delovanja entomopatogenih ogorčic



Nove generacije zapustijo gostitelja in iščejo nove gostitelje v bližini.

Ogorčice prodrejo v škodljivca in sprostijo simbiotsko bakterijo.

Entomopatogene ogorčice delujejo tako, da po vnosu v tla **poiščejo ličinke ali odrasle bramorje in prodro vanj in sprostijo simbiotsko bakterijo**. V mrtvi ličinki se razmnožujejo. Nova generacija ogorčic zapusti ličinko in išče nove ličinke bramorja v okolici. Za vrt in človeka so entomopatogene ogorčice neškodljive.

Ostale naravne rešitve proti bramorju v domačem vrtu

Proti bramorju v vrtu ukrepamo tako, da **redno rahlajmo zemljo in s tem uničujemo rove škodljivca**. To je najbolje narediti dan ali dva po dežu, ko je okopavanje in rahljanje najlažje.

Gredico okopljemo tudi po obilnem zalivanju. V vrtu lahko poiščemo tudi **gnezda in jih polijemo z vrelo vodo**. Nekateri v vodo mešajo tudi milnico in jo zlivajo v rove.





Redno rahljanje tal zmanjša škodo bramorja.

Škoduje mu tudi vratičev pripravek, odganja ga tudi močan vonj limone, ribjega olja in zelišč, ki jih potiskamo v rove. Nekaj bramorja se bo ujelo v **kozarce za vlaganje, ki jih boste postavili po vrtu in zakopali na nivo tal. Tako bo ob nočnem pohodu padel v past in prenehal s škodo v vrtu.**

Lovimo ga tudi v vabo s hlevskim gnojem

Ta vse bolj pogost vrtni škodljivec **se najbolje počuti v vrtu, ki je gnojen s hlevskim gnojem.** To lastnost lahko izkoristimo v svoj prid, če v jesenskem času (oktober) v tla skopljemo luknjo, ki je široka 1 m in dolga 1 m, globina jame naj ne presega pol metra.

Jamo napolnimo s svežim hlevskim gnojem in pokrijemo z zemljo. Bramor se v zimskem času najraje zadržuje v tem območju.



Vabo s hlevskim gnojem pripravimo v okotobru.

Področje z zimsko vabo za bramorja **označimo s palico**, da bomo ob koncu zime vedeli kje kopati. Vabo je namreč treba odkopati, ko so tla še nekoliko zamrznjena. **V februarju je torej treba gnoj izkopati in ga odstraniti z vrta.** Če obstaja možnost je najbolje, da vsebino gnoja sežgemo ali odpeljemo daleč stran od vrta.

Ptice se rade prehranjujejo z bramorjem



Skrb za ptice se v vrtu obrestuje.

Bramorja lovijo tudi njihovi naravnni plenilci. **Škorcem so prava mesna poslastica**, če je v naravi vzpostavljen ravnovesje. Te koristne ptice jih največ ulovijo v času gnezdenja. Zato se skrb za ptice v vrtu vsekakor obrestuje.

Med pticami, ki lovijo bramorja lahko omenimo tudi smrdokavro in zlatovranko. Obe vrsti sta zastopani samo še na nekaterih področjih SV Slovenije.

Bramorja lovi tudi jež, krt in ostali plenilci

Med nočnimi plenilci bramorja ne smemo pozabiti na ježa. Lovijo ga tudi hrošči brzci, žuželke, kače, rovke in krti. Tako, da krta v vrtu ne preganjam, ker je nadvse koristen. V primeru, da je na istem področju veliko število bramorjev se med njimi lahko pojavi tudi kanibalizem in se med seboj sami uničujejo.