

Če sadimo večje število grmov, potem izkopljemo jarek, ki je dovolj globok in širok, da ima vsaka sadika dovolj prostora za rast. **Ameriške borovnice lahko posadimo tudi v večje lonce, ki jih vkopljemo v zemljo.** Tudi v loncih moramo urediti drenažo in jih napolniti z ustreznim substratom.

Rez ameriških borovnic

Ameriške borovnice režemo podobno kot črni ribez. Izrezujemo stare in izrojene veje in jih nadomeščamo z novimi vejami – grme pomlajujemo. Premočne enoletne poganjke lahko nekoliko prikrajšamo. Držimo pa se pravila, da poganjkov nikoli ne krajšamo na grmu, ker bomo sicer izgubili rodnost in izmaličili grm. Borovnice rodijo na koncu poganjkov.

Gnojenje ameriške borovnice

Mešanici zemlje in šote ob sajenju vmešamo od 20 – 40 dag fiziološko kislega mineralnega gnojila za borovnice. Z omenjenim gnojilom v spomladanskem času dognojimo tudi pozneje v manjših količinah, do 10 dag na sadiko.

Ameriške borovnice nimajo velikih težav z boleznimi in škodljivci

V manjših nasadih v vrtovih, kjer borovnic ne gojimo intenzivno je tudi pojav škodljivcev in bolezni manjši. Največkrat nam težavo povzroča razkisanje zemlje in s tem povezan pojav listne bledice – kloroze. Več o tem v članku, Rastline za kisl rastišča.

Moramo biti vsekakor pozorni ob nakupu sadik, da ne zanesemo kakšnih kaparjev ali drugih bolezni.

V času zorenja borovnic moramo pridelek zaščititi z mrežo proti ptičem. Ptiči zelo radi poključajo zoreči pridelek precej hitreje, kot ga ljudje uspemo pobrati. Uporabimo kar mrežo proti toči, da zaščitimo pridelek še pred morebitnim popolnim opustošenjem in tudi pred sončnimi ožigi na listih. Mreža namreč rastline tudi delno zasenči in prepreči ožige, ne pomeni pa, da borovnice zato rastejo zato v senci.

Sorte ameriških borovnic

Sorte ameriških borovnic se razlikujejo po času zorenja, po obliki plodov, bujnosti in načinu rasti, odpornosti na boleznimi in zimske temperature, količini pridelka na kar veliko vplivajo tudi klimatske in talne lastnosti. Vse sorte niso primerne za naš klimatski prostor.

Obiranje in skladiščenje ameriških borovnic

Plod borovnic so temno modre barve s poprhom, sladko-kislega okusa, meso v notranjosti ploda je zelenkaste barve in postopoma zorijo do 5 tednov. Pojavljajo se tudi sorte rožnate barve ´Pink lemonade´. Sorte zorijo od začetka julija do septembra. Za boljšo oplodnjo in večji pridelek sadimo 3 - 5 različnih sort.

Ameriške borovnice obiramo v hladnem delu dneva, najbolje zjutraj in jih pospravimo na hladno. V hladilniku se obdržijo približno teden dni. Lahko jih tudi zamrznemo. Tako kot pri malinah tudi tu velja, da jih zamrzujemo na pladnju in šele nato zamrznjene stresemo v vrečko ali posodico.

Celoten članek na: <http://zelenisvet.com/ameriske-borovnice>

© Zeleni svet



➔ Delite nasvet tudi z vašimi prijatelji!