

Mandarine z domačega vrta

V Sloveniji plodove mandarinovcev obiramo v prvi polovici oktobra in začetku novembra. V ta namen gojimo zgodnje sorte, ki nas na sončni legi in ob primerni oskrbi razveselijo z okusnimi plodovi. V celinskem delu Slovenije jih vzgajamo kot posodovke.

V Sloveniji gojimo predvsem zelo zgodnje sorte mandarin, da lahko dozori tudi v hladnejšem podnebju. Najprej rodi sorta zorca rana in za njo še sorta chahara. Mandarine sorte zorca rana v Sloveniji obiramo v prvi polovici oktobra. To velja za osrednjo Slovenijo. Na obalnih območjih jih obiramo v septembru. Ta sorta mandarin ima srednje velik plod ploščato okrogle oblike, ki je brez semen in zelo sočen in okusen. Kožica je tanka in oranžne barve.

Nekoliko kasneje obiramo mandarine sorte *chahara*, ki dozori konec oktobra in v začetku novembra. Plod je velik in ploščat. Kožica je srednje debela in oranžne barve, ko dozori. Meso je brez semen, enako kot pri sorti *zorica rana*. Za pridelavo v večjih posodah s prostornino 70 litrov in več je v Sloveniji najbolj priporočljivo saditi sorto zorca rana, ki dozori pred jesensko slano. Nakup sadik v oktobru je najlažji na spletu.

Zgodnje sorte mandarin obiramo, ko se začnejo barvati v oranžno barvo. To je treba storiti še pred močnejšimi ohladitvami, kajti če plodove ujame močnejši mraz, okus ne bo več tako dober. Ko se ohladi, predlagam, da mandarine oberete takrat, ko se začnejo barvati v svojo značilno barvo. Plodovi so v tem primeru

še lahko zeleno-oranžni. Sokovi in hranila se ob hladnem vremenu preusmerijo v steblo in korenine, zato je treba plodove pobrati v začetni fazi zorenja. Če obiramo ne povsem zrele mandarine, je najboljša rešitev, da do konca dozori med jabolki ali bananami. V kleti jih shranimo v zaboj skupaj z jabolki. Manjšo količino lahko dozorimo skupaj z bananami v papirnati vrečki ali zaprti kartonasti škatli. V tem primeru jih zorimo pri sobni temperaturi. Tako bo zorenje še pospešeno in



| Osnovne lastnosti mandarin, ki dozori v Sloveniji | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Sorta | <i>Zorca rana</i> | <i>Chahara</i> |
| Čas zorenja (osrednja Slovenija) | od 1. oktobra do 15. oktobra | od 20. oktobra do 5. novembra |
| Velikost in oblika ploda | Srednje velik, ploščato okrogel | Zelo velik in ploščat |
| Meso ploda | Brez semen, zelo sočno in okusno | Brez semen, zelo sočno |

mandarine bodo pridobile značilen sladko-kiselkast okus.

Prve plodove obiramo tri leta po sajenju. Najlažje jih obiramo s škarjami, ki jih uporabljamo za rez sadnega drevja ali trte. Tako obrani plodovi tudi manj gnijejo, ker niso poš-

kodovani. Ko se začnejo temperature spuščati proti ledišču, je treba posode z mandarinovci pospraviti v prostor, kjer prezimujejo pri temperaturi 5 do 10 stopinj Celzija.

Davor Špehar, Zeleni svet

Dobre sorte kostanja

Za vse vrtničarje, ki imate ugodne talne in vremenske razmere za rast kostanjev, priporočam rodne in odpornejše sorte. Sorta *bouche de betizac* je manj občutljiva za kostanjevega raka in odpornejša proti kostanjevi šiškari. Zelo razširjena je tudi sorta *marsol*. Priporočam tudi sorto *precoce migoule*. Sadike kostanjev presajamo oktobra in novembra. V sadilno jamo je v času sajenja zelo priporočljivo dodati nekaj zemlje iz gozdov, kjer uspevajo samonikle vrste kostanjev.



www.zelenisvet.com

*
Za nasvet pokličite:
Davor 040 669 449