

Kako se znebimo **bramorja**

Bramorja na vrtu se lahko znebimo na več načinov. Lovimo ga lahko v kozarce, napolnjene z vodo, v hlevskem gnoju, gnezda polivamo z vodo, motimo ga z okopavanjem in zelišči. Med pticami ga lovijo predvsem škorci. Zelo učinkovito je varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki jih zmešamo z vodo za zalivanje. Teknejo tudi ježu, krtu in drugim naravnim sovražnikom.

Proti bramorju lahko ukrepamo tako, da redno rahljamo zemljo in tako uničujemo škodljivčeve rove. To je najbolje narediti dan ali dva po dežju, ko najlažje okopavamo in rahljamo zemljo. Gredico okoplamo tudi po obilnem zalivanju. Na vrtu lahko poiščemo tudi gnezda in jih polijemo z vrelo vodo. Nekateri v vodo mešajo tudi milnico in jo zlivajo v rove. Škoduje mu tudi vratičev pripravek, odganja ga močan vonj limone, ribjega olja in zelišč, ki jih potiskamo v rove. Nekaj bramorjev se bo ujelo v kozarce za vlaganje, ki jih boste postavili po vrtu in zakopali na nivo tal. Ta vse pogostejši vrtni škodljivec se najbolje počuti na vrtu, ki je gnojen s hlevskim gnojem. To lastnost lahko izkoristimo v svoj prid, če v jesenskem času (oktobra) v tla skopljemo luknjo, ki je široka in dolga meter, globina jame naj ne presega pol metra. Jamo napolnimo s sve-

žim hlevskim gnojem in pokrijemo z zemljo. Bramor se v zimskem času najraje zadržuje v gnoju. Področje z zimsko vabo za bramorja označimo s palico, da bomo ob koncu zime vedeli, kje kopati. Vabo je namreč treba odkopati, ko so tla še nekoliko zamrznjena. V februarju je torej treba gnoj izkopati in ga odstraniti z vrta. Če obstaja možnost, je najbolje, da gnoj sežgemo ali odpeljemo daleč stran od vrta.

Bramorja lovijo tudi njegovi naravni plenilci. Škorci jih največ ulovijo v času gnezdenja. Med pticami, ki lovijo bramorja, sta tudi smrdokavra in zlatovranka. Med nočnimi plenilci bramorja ne smemo pozabiti na ježa. Lovijo ga tudi hrošči brzci, žuželke, kače, rovke in krti. Če je na istem območju veliko število bramorjev, se med njimi lahko pojavi tudi kanibalizem.

Biotično zatiranje

V Sloveniji je zelo razširjeno in učinkovito tudi biotično varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki na povsem naraven način odstranijo bramorja z vrta. Uporabimo jih konec poletja, ko se vročina nekoliko umiri. Zmešamo jih z vodo in z njo zalijemo vrtno gredico. Zalivanje ponovimo tudi konec aprila in maja. Z entomopatogenimi ogorčicami zalivamo vrt dvakrat na leto. To ponavljamo vsaj tri leta, toliko traja tudi življenjska doba bramorja. Vedno zalivamo cel vrt, torej ne samo gred, na katerih rastejo ogrožene rastline. Priporočljivo je, da zalijemo tudi kakšen meter okrog vrta. Najbolje je zalivati pred dežjem ali v rahlo oblačnem vremenu, ko ni močnega sonca. Za boljše delovanje zalivanje ponovimo v 14 dneh po prvem zalivanju. Ves čas je treba ohranjati tudi vlažna tla, da se ogorčice ne izsušijo. Entomopatogene ogorčice delujejo tako, da po vnosu v tla poiščejo ličinke ali odrasle bramorje in prodro vanj in sprostijo simbiotsko bakterijo. V mrtvi ličinki se razmnožujejo. Nova generacija ogorčic zapusti ličinko in išče nove ličinke bramorja v okolici. Entomopatogene ogorčice so za vrt in človeka neškodljive.

Davor Špehar, Zeleni svet



Televizija dobrih zgodb

VIDNI PO VSEJ SLOVENIJI

Telekom · kanal 665 | T-2 · kanal 29 | A1 · kanal 304 | Telemach · kanal 706
antensko oddajanje v multipleksu A | drugi kabelski sistemi

www.vaskanal.com



Zeleni svet

www.zelenisvet.com

*

Za nasvet pokličite:
Davor 040 669 449